

Maj w ogrodzie

Maj to dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku! Nadeszła pełnia wiosny, czas kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz kwiatów cebulowych i innych bylin wiosennych. Ogród w maju zawsze wygląda najpiękniej. Dodatkowo świeża zieleń liści i nowych pędów uzupełnia ten efekt. Ciepłe i coraz dłuższe dni sprzyjają chęci przebywania na w ogrodzie i wykonywania majowych prac w ogrodzie.

Maj w sadzie

Drzewka i krzewy owocowe posadzone wiosną wymagają szczególnej uwagi ze względu na niedostatecznie jeszcze rozbudowany system korzeniowy, który przed posadzeniem został mocno uszkodzony. Dlatego powinniśmy zapewnić młodym sadzonkom odpowiednią wilgotność podłoża, spulchnianie wierzchniej warstwy gleby oraz odpowiednie nawożenie stymulujące rozwój korzeni oraz części nadziemnej. W połowie maja zasilamy młode drzewka i krzewy nawozami wieloskładnikowymi. Starsze drzewa i krzewy warto było zasilić już w kwietniu, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj to na początku maja. Nie zaleca się nawożenia obornikiem, który stanowi pożywkę dla dżdżownic, a te przyciągają krety oraz nornice. Nawożenie obornikiem w przypadku sadzenia drzewek i krzewów wykonuje się pod przedplon, czyli co najmniej 1 rok przed sadzeniem.

Jeżeli maj jest bezdeszczowy szczególnie ważne dla posadzonych wiosną młodych drzewek i krzewów staje się odpowiednio obfite podlewanie, w tym celu wokół drzewka wykonaj tzw. "misę", do której wlej nawet do 10 litrów wody. Lepiej podlewać raz obficie niż często po troszeczkę.

W tym miesiącu sady wyglądają pięknie, gdyż zakwitają drzewa owocowe. Przyczyną słabego zawiązywania owoców może być brak odpowiedniego zapylacza. Jeżeli nie masz w sadzie odmiany mogącej być zapylaczem, w pobliżu kwitnącego drzewa w wiadrze z wodą ustaw kilka kwitnących pędów odmiany dobrze zapylającej Twoje drzewo. Dla wielu odmian jabłoni (min. Katji, Delikates, Primy, Fantazji, Jonagold, Ligoł, czy Szampiona) dobrym zapylaczem jest odmiana James Grieve. Dla gruszy Konferencji, Bonkrety Williamsa i Komisówki dobrym zapylaczem będzie Faworytka (Klapsa).

Na początku maja przeprowadź przegląd oraz ręczne usuwanie zaschniętych pąków jabłoni i gruszy, z których nie wyrastają ani kwiaty ani owoce) zaatakowanych przez kwieciaka. Ten mały chrząszcz (ok. 4-5 mm) może doprowadzić do braku owocowania tych drzew, gdyż składa jaja do pąków. Z jaj wylęgają się małe gąsienice, które wyjadają słupek i pręciki kwiatów. Pąki zasychają. Przy obfitym kwitnieniu kwieciaki dużych szkód nie wyrządzą ale przy średnim lub mało obfitym kwitnieniu szkody będą duże. Walka ze szkodnikiem niestety polega na p/ochronie chemicznej. Podobnie brak oblotu pszczoł powoduje duże obniżenie owocowania.

Połowa maja to najdogodniejszy moment na zawieszenie pułapek wabiących owady, których gąsienice żerują w zawiązkach i owocach. Szczególnie jest to istotne w walce z owocówkami oraz nasionnicą trześniówką (robaczywienie czereśni). Walka z nasionnicą trześniówką polega głównie na oprysku środkami chemicznymi.

Ładna pogoda sprzyja pojawieniu się mszyc. Aby się z nimi uporać, zabiegi ochronne rozpoczynamy gdy tylko pojawią się pierwsze kolonie tego szkodnika. Przede wszystkim usuwamy najsilniej porażone liście i wierzchołki pędów z koloniami mszyc. Przeprowadzamy oprysk wyciągiem z pokrzywy, czosnku lub cebuli. Jeżeli szkodników jest dużo musimy sięgnąć po "chemię".

W tym miesiącu zaczynają również kwitnąć truskawki i poziomki. Należy pamiętać, że truskawki dla osiągnięcia zadawalających planowania wymagają nawadniania. Owoce truskawki rosnącej w suchej głębie są małe i drobne. Podleając truskawki nie zraszamy ich liści tylko podlewamy w międzyrzędziach. Truskawki są atakowane przez choroby grzybowe (szara pleśń oraz drobna plamistość liści). W okresie kwitnienia nie dokonujemy oprysku na te choroby. Robimy to przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu. Szczególne obniża plon szara pleśń, której rozwojowi sprzyja ciepła i wilgotna pogoda. Dwu-trzykrotny oprysk znacznie ogranicza rozwój choroby.

Maj w ogrodzie warzywnym

Od połowy maja można przystąpić do sadzenia warzyw nie odpornych na nocne przymrozki.

Sadzimy więc rozsadę pomidorów i papryki, siejemy ogórki gruntowe, cukinię, melony (arbuzy) oraz fasolę (ew. wysadzamy rozsadę ogórków, cukinii, arbuza i selera). W maju wysiewamy również kukurydzę cukrową. Ciepłolubna kukurydza cukrowa powinna być wysiana dopiero pod koniec miesiąca.

W maju możliwe są już pierwsze zbiory warzyw wysianych pod osłonami i w tunelach foliowych, min. cebuli, szczypioru i rzodkiewki.

Zbieramy również plony z siewu ozimego i warzywa wieloletnie, takie jak szparag, rabarbar ogrodowy czy szczaw.

Wielu ogrodników-amatorów wybiera najłatwiejszy sposób uprawy, jakim jest wysiew warzyw bezpośrednio do gruntu. Ciągłe zbiory warzyw umożliwi nam systematyczny siew nasion - od początku do drugiej połowy maja wysiewamy rzodkiewkę i sałatę, przez cały miesiąc możemy wysiewać marchew i burak ćwikłowy do przechowywania.

Rosnące warzywa wymagają pielęgnacji - nawadniania, spulchniania i odchwaszczania gleby oraz przerywania gatunków uprawianych z siewu.

Silny okres wzrostu pod koniec maja przechodzą pomidory. Ich łodyżki są dość słabe, należy zatem każdą roślinę zaopatrzyć w silny palik, do którego delikatnie przywiązujemy roślinę. Paliki powinny mieć długość co najmniej 1,5 m. Pomidory potrzebują dużo wody, którą należy lać w rowek wokół rośliny.

Maj w ogrodzie ozdobnym

Nadszedł czas na wysianie roślin dwuletnich.

W pierwszej połowie maja możemy jeszcze wysiewać niektóre letnie kwiaty jednoroczne.

W maju możemy nadal przesadzać i dzielić byliny, pamiętajmy przy tym aby przyciąć zbyt mocno rozrośnięte, nadziemne części roślin.

Początek maja to okres kiedy należy zahartować sadzonki, rozsady kwiatów oraz podkiełkowane cebule i bulwy, np. begonii bulwiastej, które dotychczas były w inspektach lub innych pomieszczeniach.. Wysadzanie zaczniemy po zimnych ogrodnikach (czyli od 16 maja). Tymczasem w celu przyzwyczajenia roślin do warunków zewnętrznych, przy ładnej pogodzie dobrze jest wietrzyć inspekty. Dobry wzrost warunkuje odpowiednia ilość światła.

W maju kończy się okres intensywnego wzrostu roślin cebulowych (narcyzy, tulipany itp.). Cały czas spulchniamy podłoże i usuwamy chwasty. Na początku maja dokonujemy ostatniego nawożenia łatwo przyswajalnymi nawozami wieloskładnikowymi. Te składniki nawozowe rośliny wykorzystają do wytworzenia nowych cebulek i bulwek. U przekwitłych roślin

wyłamujemy kwiaty u nasady. Gdy cebulowym zaczynają żółknąć liście (oznacza wejście w stan spoczynku), zaprzestajemy ich podlewania.

Krzewy i drzewa kwitnące wiosną i wytwarzające latem nowe pędy zaleca się ciąć zaraz po okresie kwitnienia. Dotyczy to takich gatunków, jak np. wierzba lwa czy migdałowiec trójklapowy. Pędy przycinamy krótko, zazwyczaj na długość 2-3 oczek, dzięki czemu na drzewku pojawi się wiele młodych pędów.

Maj to idealny czas na przycinanie sosny. W tym miesiącu przycinamy nowe przyrosty, na których nie ma jeszcze igiełek. W ten sposób je skrócimy, nie uszkadzając jednak samych igieł.

Młode rośliny, które mają być krzaczaste, należy silnie przycinać. Fuksje i dalej nie powinny mieć więcej niż po dwa pędy, resztę usuwamy, co pozwoli osiągnąć silny wzrost rośliny.

Jeżeli na bukszpanach zauważyliśmy pozwijane liście (przypominające wyglądem kapuściane główki), to znaczy że krzewy zaatakował szkodnik - miodówka bukszpanowa. Szkodnik ten podczas żerowania wydziela rosę miodową i воск w postaci śnieżnobiałych poskręcanych nici. Jako środek zapobiegawczy pomaga systematyczne cięcie krzewów. Opryski rozpoczynamy od początku maja, gdy zauważymy pierwsze objawy żerowania miodówki. Rośliny opryskujemy preparatem np. Mospilan 20 SP (w stężeniu 0,02%), Actellic 500 EC (0,1%). Podobnie oprysk należy wykonać na ćmę bukszpanową, która w ostatnich latach dokonała ogromnych zniszczeń w krzewach bukszpanu.

Na krzewach róż mogą pojawić się dzikie pędy wyrastające spod miejsca okulizacji. Zauważone "dziczki" należy natychmiast wyłamać, odsypując jednocześnie ziemię z okolic szyjki korzeniowej. Celem uzyskania pięknych kwiatów należy różę nawozić nawozami wieloskładnikowymi, chronić przed chorobami grzybowymi oraz mszycami uszkadzającymi pędy kwiatowe.

Pod koniec miesiąca zaczynają przekwitać lilaki, przekwitłe kwiatostany dobrze jest natychmiast usuwać, dzięki temu rośliny te zakwitną równie obficie w przyszłym roku.

Wskazane jest też nawożenie roślin kwasolubnych (iglaki) siarczanem amonu lub innym nawozem dla tego typu roślin.

Trawnik w maju

Jeżeli na trawniku pojawia się mech, glebę należy spulchnić widłami lub walcem kołkowym. Można skorzystać również ze specjalnych, regulowanych urządzeń, usuwających martwą trawę i mech (wertykulator).

W przypadku wyrastania w trawniku roślin dwuliściennych (mniszek lekarski, stokrotka lub innych) należy je usuwać ręcznie przy małej ilości. Jeżeli występuje ich duża ilość, konieczne jest użycie odpowiednich środków do zwalczania chwastów w trawniku (Mniszek, Starane). Środki te nie stosujemy zaraz po wykoszeniu trawy, lecz gdy liście chwastów się rozwiną.

Ponadto aby trawnik ładnie wyglądał należy po każdym wykoszeniu trawy zasilić ją nawozem azotowym. Należy również nie zapominać o nawadnianiu.